

DOSIFICACIÓN SUGERIDA PARA CONCENTRADOS DE FVIII Y FIX DE VIDA MEDIA PROLONGADA, EN PAÍSES CON RECURSOS LIMITADOS

Patrones de práctica: Niveles plasmáticos de factor pico y duración de la administración

Concentrados de factor de coagulación de vida media prolongada

	Hemofilia A FVIII		Hemofilia B FIX	
	Nivel de factor pico (UI>dL)	Duración de la terapia	Nivel de factor pico (UI>dL)	Duración de la terapia
PROFILAXIS				
	10	Cada 4 días	10–20	Cada 7 días
	20	Cada 7 días	20	Cada 10 días
A PEDIDO – TRATAMIENTO EPISÓDICO				
Hemorragias leves/moderadas				
Hemartrosis precoz, hemorragia muscular u oral; hemorragia articular grave (hemartrosis extensa), hemorragia o hematoma musculares (iliopsoas, pantorrilla y antebrazo)	10 Repetir la infusión cada 24–48 horas	Hasta que se resuelva el episodio hemorrágico (generalmente 1-2 días resultados >90% eficacia)	10–20 Repetir la infusión cada 48 horas	Hasta que se resuelva el episodio hemorrágico
Hemorragias mayores (hemorragias que ponen en peligro la vida)				
Intracraneal, intratorácica, gastrointestinal, y renal	30–40 Repetir la infusión cada 12–24 horas	Hasta que se resuelva el episodio hemorrágico (medir el nivel de FVIII, si fuera <50–70% repetir la infusión cada 24 horas)	50–60 Repetir la infusión cada 24 horas durante los primeros 3 días, después repetir la infusión cada 48–72 horas hasta que cese la hemorragia	Hasta que se resuelva el episodio hemorrágico (aproximadamente 7–10 días)
CIRUGÍA				
Menor (incluyendo extracciones dentales)				
	20–30 Repetir la infusión cada 24 horas	1–3 días, dependiendo del tipo de procedimiento	30–40 Repetir la infusión cada 48 horas	Por lo menos 1 día hasta una adecuada sanación de la herida
Mayor				
Preoperatorio	30–40	Cada 12–24 horas durante las primeras 48 horas o hasta una adecuada sanación de la herida, después repetir la infusión cada 24-48 horas durante por lo menos 7 días	40–60	Cada 12 horas durante las primeras 24 horas o hasta una adecuada sanación de la herida, después repetir la infusión cada 48 horas durante por lo menos 7 días
Posoperatorio	20 Después de 12 horas y enseguida cada 24 horas		20–40 Cada 24–48 horas	

Exención de responsabilidad

- Las dosis anteriores constituyen una extrapolación del Capítulo 7 de las Guías de la FMH para el tratamiento de la hemofilia y no han sido evaluadas mediante una valoración formal de pruebas científicas por parte de los paneles de las guías.
- La Federación Mundial de Hemofilia no se involucra en el ejercicio de la medicina y bajo ninguna circunstancia recomienda tratamientos específicos para personas particulares.
- Los esquemas de dosificación y otros regímenes de tratamiento se revisan continuamente, además de que se reconocen nuevos efectos secundarios. Por estas razones, se recomienda enfáticamente a las personas consultar a un proveedor de atención médica.

Para mayor información comuníquese con el doctor Assad Haffar, director médico de la FMH.

Tel: (514) 875-7944 #2830 ■ Correo-e: ahaffar@wfh.org