


Глава 7

ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Джонни Махлангу, Джерард Долан, Элисон Дугалл, Николас Дж. Годдард, Энрике Д. Преза Эрнандес, Маргарет В. Рагни, Брэдли Рейнер, Джерзи Виндига, Гленн Ф. Пиэрс, Алок Шривастава

- Основными клиническими признаками гемофилии являются длительные спонтанные и/или вызванные травмой геморрагии.
- Основным средством для лечения геморрагических эпизодов у пациентов с тяжелой гемофилией является заместительная терапия концентратами фактора (незамедлительно) и реабилитация.
- В лечении геморрагии конкретной локализации ставится задача не только пролечить кровотечение, но также предотвратить его рецидив, ограничить осложнения и восстановить ткань и/или функцию органа до состояния перед кровотечением.



1. Внутричерепное кровоизлияние

Симптомы:

- Травма головы
- Головная боль
- Сонливость
- Острая боль в спине



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС (до выполнения диагностики)
- Немедленная госпитализация и медицинский осмотр неврологом

3. Желудочно-кишечные/брюшинные кровотечения

Симптомы:

- Кровавая рвота
- Наличие крови в кале
- Мелена (черный кал)



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС (до выполнения диагностики)
- Немедленная госпитализация и медицинское обследование
- Антифибринолитики
- Лечение причины кровотечения

2. Почечные кровотечения

Симптомы:

- Боль в животе
- Вздутие живота
- Боли в боку и спине
- Кровь в моче



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Достаточная гидратация (восполнение потери жидкости)
- Постельный режим

4. Кровоизлияние в сустав

Симптомы:


- Опухание
- Горячая на ощупь кожа
- Усиление боли
- Потеря объема движения



Лечение:

- Немедленное введение КФС
- Болеутоляющие
- Подходы: RICE (покой, лед, сжатие и приподнятое положение), PRICE (защита, покой, лед, сжатие и приподнятое положение) или POLICE (защита, оптимальная нагрузка, лед, сжатие и приподнятое положение)
- Лечебная физкультура и реабилитация

Глава 7 ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ



1. Офтальмологическое кровоизлияние

Симптомы:

- Кровоизлияние в глаз

Причина:

- Возможная травма или инфекция

Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС (до выполнения диагностики)
- Регулярный осмотр каждые 6-8 часов до прекращения кровотечения



2. Эпистаксис

Симптомы:

- Кровотечение из носа

Причина:

- Раздражение
- Травма

Лечение:

- Приподнятое положение головы
- Сжатие
- Марля, пропитанная антифибринолитиком
- Избегать тампонады носа
- Применение КФС по показаниям
- Можно обойтись без обращения в больницу (за исключением случаев повторяющегося или неостанавливающегося эпистаксиса)



3. Кровоизлияние в ротовую полость

Симптомы:

- Кровотечение во рту

Причина:

- Удаление зуба
- Заболевание десен
- Травма

Лечение:

- Удерживать прямое надавливание 15-30 минут / швы и адреналин при необходимости
- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Консультация стоматолога
- Без интенсивных занятий спортом, мягкая пища (3-5 дней)
- Не курить 24 часа
- При необходимости мягкая шина



4. Кровоизлияния в области шеи/горла

Симптомы:

- Увеличение отека в области шеи
- Усиление боли в области шеи

Причина:

- Местная патология
- Травма
- Кашель

Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС (до выполнения диагностики)
- Немедленная госпитализация и медицинский осмотр отоларингологом

