


Глава 7

ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Джонни Махлангу, Джерард Долан, Элисон Дугалл, Николас Дж. Годдард, Энрике Д. Преза Эрнандес, Маргарет В. Рагни, Брэдли Рейнер, Джерзи Виндига, Гленн Ф. Пиэрс, Алок Шривастава

Лечение кровотечений различной локализации: ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ



1. Внутричерепное кровоизлияние

Симптомы:

- Травма головы
- Головная боль
- Сонливость
- Острая боль в спине



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС (до выполнения диагностики)
- Немедленная госпитализация и медицинский осмотр неврологом

2. Кровотечения в почках (почечные кровотечения)

Симптомы:

- Боль в животе
- Вздутие живота
- Боли в боку и спине
- Кровь в моче



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Достаточная гидратация (восполнение потери жидкости)
- Постельный режим

3. Желудочно-кишечные/брюшинные кровотечения

Симптомы:

- Кровавая рвота
- Наличие крови в кале
- Мелена (черный кал)



Лечение:

- Незамедлительное введение КФС (до выполнения диагностики)
- Немедленная госпитализация и медицинское обследование
- Антифибринолитики
- Лечение причины кровотечения

4. Кровоизлияние в сустав

Симптомы:

- Ощущение покалывания и стеснения внутри сустава
- Опухание, потеплевшая на ощупь кожа
- Усиление боли
- Потеря объема движения




Лечение:

- Немедленное введение КФС
- Болеутоляющие
- Подходы: RICE (покой, лед, сжатие и приподнятое положение), PRICE (защита, покой, лед, сжатие и приподнятое положение) или POLICE (защита, оптимальная нагрузка, лед, сжатие и приподнятое положение)
- Лечебная физкультура и реабилитация

КФС = заместительная терапия концентратом фактора свертывания

Глава 7 ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ



1. Кровоизлияния в глаз (офтальмологические)

Причина:

- Возможная травма или инфекция



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Регулярный осмотр каждые 6-8 часов до прекращения кровотечения

2. Эпистаксис (кровотечение из носа)

Причина:

- Раздражение
- Травма



Лечение:

- Приподнятое положение головы
- Сжатие
- Марля, пропитанная антифибринолитиком
- Избегать тампонады носа
- Применение КФС по показаниям

3. Кровоизлияние в ротовую полость

Причина:

- Удаление зуба
- Заболевание десен
- Травма



Лечение:

- Удерживать прямое надавливание 15-30 минут / швы и адреналин при необходимости
- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Консультация стоматолога
- Без интенсивных занятий спортом, мягкая пища (3-5 дней)
- Не курить 24 часа
- При необходимости мягкая шина

4. Кровоизлияния в области шеи/горла

Причина:

- Местная патология
- Травма
- Сильный кашель



Лечение:

- Незамедлительная терапия с помощью КФС
- Немедленная госпитализация и медицинский осмотр отоларингологом