



WORLD FEDERATION OF HEMOPHILIA
FÉDÉRATION MONDIALE DE L'HÉMOPHILIE
FEDERACIÓN MUNDIAL DE HEMOFILIA

الديزموبريسين (DDAVP)

ما هو الديزموبريسين؟

الديزموبريسين (يُعرف كذلك باسم DDAVP، والتي تُمثل -1 ديامينو-8-د-أرجينين فاسوبريسين) هو دواء اصطناعي يعزز مستويات العامل الثامن (FVIII) وعامل فون ويلبراند (VWF) لمنع أو السيطرة على النزيف. وكلفتة أقل من تكلفة منتجات البلازما بكثير، ولا يُشكل أي خطر لانتقال العدوى الفيروسية.

من يمكنه استخدام الديزموبريسين؟

- قد يكون الـ DDAVP هو العلاج الأمثل لمرضى الهيموفيليا A الخفيفة أو المعتدلة، والنوع 1 من مرض فون ويلبراند (VWD).
- انه مفيد خصوصا لعلاج أو الوقاية من النزيف لدى حاملي مرض الهيموفيليا.
- قد يكون DDAVP مفيدا كذلك للسيطرة على النزيف وتقليل وقته لبعض اضطرابات الصفائح الدموية الخلقية.
- يستخدم DDAVP كثيراً أثناء إجراءات عمليات الأسنان والعمليات الجراحية البسيطة.
- لا يؤثر DDAVP على مستويات العامل التاسع (FIX)، كما لا يُستخدم لمعالجة الهيموفيليا B.

كيف يُستخدم الديزموبريسين؟

يستخدم الـ DDAVP فقط لعلاج المرضى الذين لديهم مستوى معين من العاملين (FVIII) أو (VWF) في البلازما. ورغم أن الـ DDAVP يعطى تحت الجلد لأغلب المرضى، إلا أنه يمكن إعطاؤه كذلك في الوريد أو عن طريق بخاخ الأنف. وتشمل الإعدادات الشائعة:

- 4 ميكروغرام/ مل للاستخدام عن طريق الوريد
- 15 ميكروغرام/ مل للحقن تحت الجلد،
- 150 ميكروغرام للجرعات المقننة، كبخاخ الأنف

هل يحتوي الديزموبريسين على آثار جانبية؟

يحتوي استخدام الـ DDAVP، شأنه شأن جميع الأدوية، مخاطر بعض الآثار الجانبية، ومن أكثر تلك الأعراض شيوعاً هو الاحمرار المؤقت للوجه أو التعرق. وقد يحدث أحياناً صداع، ودوار، وآلام خفيفة في المعدة. يجعل الـ DDAVP الجسم يحتفظ بالسوائل، لذا من الضروري تقليل كمية السوائل المتناولة أثناء فترة العلاج.

بسبب احتباس الماء، ينبغي استخدام الـ DDAVP بحذر لعلاج الأطفال الصغار، ولا ينبغي استخدامه للأطفال دون الثانية من العمر.

يجب اختبار استجابة كل مريض قبل مباشرة استخدام العلاج، إذ أن هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد، وتتنوع الاستجابة لجرعات الأنف أكثر من سواها، وبالتالي فهي أقل قابلية للتنبؤ.

تعرفوا على المزيد حول الـديزموبريسين

- تم استخدام علاج الـ DDAVP منذ عام 1977 لمعالجة المصابين باضطرابات النزف.
- تضم قائمة الأدوية النموذجية الأساسية (EML) لمنظمة الصحة العالمية (WHO) دواء الـ DDAVP.
- تم اعتماد الـ DDAVP من قبل منظمي القطاع الصحي لعدد من البلدان، منها في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
- يُصنع أكثر من 70 منتجاً من DDAVP أو يتوفر في أكثر من 50 بلداً.
- تكلفة العلاج بالـ DDAVP أقل بكثير من العلاج بتركيزات عوامل التخثر.

مزيد من المعلومات (متاحة للتنزيل المجاني عبر الرابط www.wfh.org/publications).

1. علاج اضطرابات النزف، علاج الهيموفيليا
(Mannucci, P.M. Desmopressin (DDAVP) in the Treatment of Bleeding Disorders, Treatment of Hemophilia)، الاتحاد العالمي للهيموفيليا (WFH)، 2012.
2. المبادئ التوجيهية لإدارة الهيموفيليا، الطبعة الثانية (صفحة 41)
(Guidelines for the Management of Hemophilia) – من إعداد فريق عمل إرشادات العلاج، بالنيابة عن الاتحاد العالمي للهيموفيليا (WFH)، 2012.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالاتحاد العالمي للهيموفيليا

هاتف: +1 (514) 875-7944 ▪ فاكس: +1 (514) 875-8916 ▪ بريد إلكتروني: wfh@wfh.org ▪ www.wfh.org