

Capítulo 5

AGENTES HEMOSTÁTICOS

Steven W. Pipe, Manuel Carcao, Kim Chew, Radoslaw Kaczmarek, Steve Kitchen, Johnny Mahlangu, Margareth C. Ozelo, Ekawat Suwataroj, Jerzy Windyga, Glenn F. Pierce, Alok Srivastava

Agentes hemostáticos: LO QUE USTED NECESITA SABER

Los **concentrados de factor de coagulación** constituyen el tratamiento preferido para personas con hemofilia dado que son muy seguros y eficaces para el tratamiento y la prevención de hemorragias. Los hay de dos tipos:

1 **Productos derivados de plasma** (plasma donado)

2 **Productos recombinantes** fabricados a partir de células diseñadas genéticamente



Los **CFC** tanto **derivados de plasma** como **recombinantes** son igualmente eficaces y seguros, y la FMH no recomienda un tipo de tratamiento por sobre el otro. Su médico elegirá el mejor producto para usted, dependiendo del tipo de hemofilia que tenga, y de la disponibilidad y el costo de los productos.

Los CFC de **vida media prolongada (VMP)** son un tipo de CFC ideados para permitir un mayor tiempo entre infusiones, en comparación con los productos de vida media estándar (VME).

El **emicizumab**, una terapia sin factor de remplazo, ofrece un tratamiento alternativo y se recomienda como profilaxis periódica para pacientes con hemofilia A, con y sin inhibidores.

Los CFC deberían preferirse por sobre el crioprecipitado o el plasma fresco congelado debido a preocupaciones respecto a la calidad, seguridad y eficacia de estos últimos. No obstante, la FMH reconoce la realidad de que todavía se utilizan ampliamente en países de todo el mundo en los que constituyen las únicas opciones de tratamiento disponibles o asequibles.

Existen **otros agentes hemostáticos** usados en situaciones muy específicas:

Los **agentes de desvío** usados para el tratamiento y la prevención de hemorragias en pacientes con hemofilia A y B que presentan inhibidores:

- Concentrado de complejo de protrombina activado (CCPa) para la hemofilia A.
- Factor VII activado recombinante (rFVIIa) para la hemofilia B.

La **desmopresina** (DDAVP) se recomienda para pacientes con hemofilia A leve o moderada y para portadoras de hemofilia A.

Los **antifibrinolíticos**, tales como el ácido tranexámico, se utilizan para controlar hemorragias superficiales en mucosas y tejidos blandos, así como para cirugías dentales o erupción de los dientes.