


Chapitre 7

TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES PARTICULIÈRES

Johnny Mahlangu, Gerard Dolan, Alison Dougall, Nicholas J. Goddard, Enrique D. Preza Hernández, Margaret V. Ragni, Bradley Rayner, Jerzy Windyga, Glenn F. Pierce, Alok Srivastava

- Sur le plan clinique, l'hémophilie se caractérise principalement par des hémorragies spontanées et/ou consécutives à un traumatisme.
- Chez les patients atteints d'hémophilie sévère, les épisodes hémorragiques doivent être pris en charge rapidement avec des facteurs de coagulation et faire l'objet d'une rééducation.
- La prise en charge des hémorragies spécifiques vise non seulement à traiter le saignement, mais également à prévenir toute récurrence, à limiter les complications et à rétablir la fonction initiale des tissus et/ou des organes.



1. Hémorragie intracrânienne

Symptômes :

- Blessure à la tête
- Céphalée
- Somnolence
- Douleur aiguë au dos



Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation (avant tout examen)
- Hospitalisation immédiate et examen médical par un neurologue

2. Hémorragie rénale

Symptômes :

- Douleurs abdominales
- Gonflement de l'abdomen
- Douleur aux flancs et au dos
- Hématurie



Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation
- Réhydratation
- Alitement complet

3. Hémorragie gastro-intestinale/abdominale

Symptômes :

- Hématémèse
- Hématochézie (rectorragie)
- Méléna (selles noires)



Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation (avant tout examen)
- Hospitalisation immédiate et examen médical
- Anti-fibrinolytiques
- Traitement de l'étiologie sous-jacente

4. Hémorragie articulaire

Symptômes :


- Gonflement
- Augmentation de la chaleur de la peau
- Augmentation de la douleur
- Perte d'amplitude de mouvement



Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation
- Analgésiques contre la douleur
- RICE (repos, glace, compression et élévation), PRICE (protection, repos, glace, compression et élévation), ou POLICE (protection, charge optimale, repos, glace, compression et élévation)
- Kinésithérapie et rééducation

Chapitre 7 TRAITEMENT DES HÉMORRAGIES PARTICULIÈRES



1. Hémorragie ophtalmique

Symptômes :

- Saignement de l'œil



Causes possibles :

- Traumatisme ou infection de l'œil

Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation (avant tout examen)
- Surveillance toutes les six à huit heures, jusqu'à l'arrêt des saignements.

2. Épistaxis

Symptômes :

- Saignements de nez



Causes possibles :

- Irritation
- Lésion

Traitement :

- Surélever la tête
- Compression
- Compresse imbibée d'agent anti-fibrinolytique
- Éviter les mèches nasales
- Concentrés de facteur de coagulation, si justifié
- Il ne sera pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital (sauf en cas d'épistaxis récurrente ou si l'épistaxis ne s'interrompt pas)

3. Hémorragie buccale

Symptômes :

- Saignements dans la bouche



Causes possibles :

- Extraction dentaire
- Maladie des gencives
- Traumatisme

Traitement :

- Compression directe de 15 à 30 min/ sutures et adrénaline si nécessaire
- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation
- Consultation d'un dentiste
- Pas de sports intenses, alimentation molle pendant trois à cinq jours
- Ne pas fumer pendant 24 heures
- Gouttière dentaire souple si besoin

4. Hémorragie au niveau de la gorge et du cou

Symptômes :

- Gonflement au niveau du cou
- Douleur accrue au niveau du cou



Causes possibles :

- Pathologie locale
- Traumatisme
- Toux

Traitement :

- Injection immédiate de concentrés de facteur de coagulation (avant tout examen)
- Hospitalisation immédiate et examen médical par un ORL