

DOSAGE CONSEILLÉ POUR LES CONCENTRÉS DE FACTEUR DE COAGULATION FVIII & FIX À DEMI-VIE PROLONGÉE POUR LES PAYS À RESSOURCES LIMITÉES

Modèles pratiques : taux maximal du facteur plasmatique et durée d'administration

Concentrés de facteur de coagulation à demi-vie prolongée

	Hémophilie A FVIII		Hémophilie B FIX	
	Taux maximal (UI>dl)	Durée du traitement	Taux maximal (UI>dl)	Durée du traitement
PROPHYLAXIE	10 20	Tous les 4 jours Tous les 7 jours	10–20 20	Tous les 7 jours Tous les 10 jours
TRAITEMENT À LA DEMANDE (PONCTUEL)				
Saignements mineurs/modérés				
Hémarthrose précoce, hémorragie musculaire ou hémorragie buccale ; hémorragie articulaire grave (hémorragie grave), hémorragie musculaire ou hématome (ilio-psoas, mollet et avant-bras)	10 Perfusion répétée toutes les 24–48 heures	Jusqu'à résolution de l'épisode hémorragique (habituellement 1-2 jours pour une efficacité >90 %)	10–20 Perfusion répétée toutes les 48 heures	Jusqu'à résolution de l'épisode hémorragique
Saignements majeurs (hémorragies engageant le diagnostic vital)				
Intracrânien, intrathoracique, gastro-intestinal et rénal	30–40 Perfusion répétée toutes les 12–24 heures	Jusqu'à résolution de l'épisode hémorragique (mesurer le taux de FVIII, si taux <50–70 % perfusion répétée toutes les 24 heures)	50–60 Perfusion répétée toutes les 24 heures les 3 premiers jours, puis toutes les 48–72 heures jusqu'à arrêt du saignement	Jusqu'à résolution de l'épisode hémorragique (environ 7–10 jours)
CHIRURGIE				
Mineure (notamment extraction dentaire)	20–30 Perfusion répétée toutes les 24 heures	1–3 jours, en fonction du type de procédure	30–40 Perfusion répétée toutes les 48 heures	Au moins 1 jour jusqu'à ce qu'une cicatrisation adéquate se produise
Majeure				
Pré-opératoire	30–40	Toutes les 12–24 heures	40–60	Toutes les 12 heures pendant les
Post-opératoire	20 Après 12 heures, puis toutes les 24 heures	premières heures ou jusqu'à cicatrisation adéquate de la plaie, puis perfusion répétée toutes les 24-48 heures pendant au moins 7 jours	20–40 Toutes les 24–48 heures	24 premières heures ou jusqu'à cicatrisation adéquate de la plaie, puis perfusion répétée toutes les 48 heures pendant au moins 7 jours

Avis de non-responsabilité

- Les doses ci-dessus sont une extrapolation du chapitre 7 des lignes directrices de la FMH pour la prise en charge de l'hémophilie et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation formelle des éléments probants par les panels d'experts des lignes directrices.
- La Fédération mondiale de l'hémophilie ne pratique en aucun cas la médecine et ne recommande en aucun cas un traitement particulier pour des individus spécifiques.
- La posologie et les protocoles de soins font l'objet d'une révision permanente et d'éventuels effets secondaires identifiés. Il est donc fortement recommandé aux individus de demander l'avis d'un professionnel de santé.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Dr. Assad Haffar, Directeur médical de la FMH

Tél : +1 (514) 875-7944 #2830 ■ Courriel : ahaffar@wfh.org