

## Предлагаемые дозировки пролонгированных препаратов факторов свертывания крови VIII и IX в странах с ограниченными ресурсами

Сложившаяся практика: пиковые уровни фактора в плазме и продолжительность введения

### Концентраты факторов свертывания крови с удлинённым периодом полувыведения (пролонгированные)

|   | Гемофилия А<br>FVIII                                     |  | Гемофилия В<br>FIX  |   |
|---|--|--|---|---|
|   | Пиковый уровень фактора (МЕ>дл)                          | Продолжительность лечения  | Пиковый уровень фактора (МЕ>дл)   | Продолжительность лечения   |
| <b>ПРОФИЛАКТИКА</b>   |  |  |   |   |
|   | <b>10</b>  | Через каждые 4 дня   | <b>10–20</b>  | Через каждые 7 дней   |
|   | <b>20</b>  | Через каждые 7 дней  | <b>20</b>   | Через каждые 10 дней  |
| <b>ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ (ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ)</b>  |  |  |   |   |
| <b>Незначительные/Умеренные кровотечения</b>  |  |  |   |   |
| Начальный гемартроз, кровоизлияние в мышцу или в ротовую полость; серьезные кровоизлияния в суставы (обширный гемартроз), кровоизлияние в мышцу или гематома (подвздошно-поясничная, икроножная или предплечье) | <b>10</b><br>Повторять инфузию каждые 24–48 часов        | До устранения эпизода кровотечения (обычно после 1–2 применений эффект достигается в >90% случаев)   | <b>10–20</b><br>Повторять инфузию каждые 48 часов   | До устранения эпизода кровотечения  |
| <b>Крупные кровотечения</b> (жизнеугрожающие кровоизлияния)   |  |  |   |   |
| Внутричерепное, внутригрудное, желудочно-кишечное и почечное  | <b>30–40</b><br>Повторять инфузию каждые 12–24 часа      | До устранения эпизода кровотечения (измерить уровень FVIII; при уровне <50–70% повторять инфузию каждые 24 часа)   | <b>50–60</b><br>Повторять инфузию каждые 24 часа в течение первых 3 дней, затем повторять инфузию каждые 48–72 часа до остановки кровотечения | До устранения эпизода кровотечения (приблизительно 7–10 дней)   |
| <b>ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ</b>   |  |  |   |   |
| <b>Небольшие</b> (включая удаление зуба)  |  |  |   |   |
|   | <b>20–30</b><br>Повторять инфузию каждые 24 часа         | 1–3 дня, в зависимости от типа медицинского вмешательства  | <b>30–40</b><br>Повторять инфузию каждые 48 часов   | Не менее 1 дня до удовлетворительного заживления раны   |
| <b>Крупные</b>  |  |  |   |   |
| До операции   | <b>30–40</b>   | Через каждые 12–24 часа в течение первых 48 часов или до удовлетворительного заживления раны; затем повторять инфузию через каждые 24–48 часов не менее 7 дней | <b>40–60</b>  | Каждые 12 часов в течение первых 24 часов или до удовлетворительного заживления раны; затем повторять инфузию каждые 48 часов не менее 7 дней |
| После операции  | <b>20</b><br>Через 12 часов и далее через каждые 24 часа |  | <b>20–40</b><br>Каждые 24–48 часов  |   |

#### Отказ от ответственности

- Вышеуказанные дозировки получены в результате экстраполяции информации из Главы 7 «Руководства ВФГ по лечению гемофилии» и не проходили официальной оценки доказательств авторами «Руководства».
- ВФГ не занимается медицинской практикой и ни при каких обстоятельствах не дает индивидуальных терапевтических рекомендаций конкретным пациентам.
- Режимы введения доз и прочие схемы лечения постоянно пересматриваются; выявляются новые побочные эффекты. По этой причине пациентам настоятельно рекомендуется обращаться за консультацией к медицинским специалистам.

Контакты для получения дополнительной информации: доктор Асад Хаффар (Assad Haffar), директор ВФГ по медицинским вопросам

тел.: +1 (514) 875-7944 #2830 ■ эл.почта: [ahaffar@wfh.org](mailto:ahaffar@wfh.org)

Дополнительная информация о «Руководстве ВФГ по лечению гемофилии» доступна на сайте [www.WFH.org/TGResourceHub](http://www.WFH.org/TGResourceHub)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К 7 ГЛАВЕ 3-го ИЗДАНИЯ «РУКОВОДСТВА ВФГ ПО ЛЕЧЕНИЮ ГЕМОФИЛИИ»**