

## الفصل 3 التشخيص المخبري والمراقبة

ستيف كنتشين، فرانسيسكو دي باولا كاريتا، سيلمارا أ. دي ليمّا مونتالفاو، إيمانغويدر، رادوسلو كازماريك، كلود تايوتاني، بيار تولون، غلان ف. بيرس، أوك سريفاستافا،


### التشخيص المخبري والمراقبة: ما تحتاجون لمعرفته

قد يكون للاضطرابات النزفية المختلفة أعراض متشابهة جدًا. لذا، يُعتبر التشخيص الصحيح ضروريًا لضمان حصول المريض على العلاج المناسب.

### يستند تشخيص الهيموفيليا إلى:

2 **اختبارات مقياسة العامل** وغيرها من الاستقصاءات المحددة لتحديد التشخيص المحدد

1 **اختبارات فحص الدم** قياس زمن البروثرومبين PT أو زمن الثرومبولاستين الجزئي المفاعل APTT أو اختبارات وظيفة الصفائح، التي تقيس نشاط عامل التخثر في الدم



بعد اختبار الفحص الأولي للهيموفيليا، يتم فحص الدم بشكل دوري لمراقبة التغيرات في كمية العامل في الدم. وقد تتغير مستويات العامل استجابةً لعلاج الهيموفيليا.

الصيام ليس ضروريًا عادةً قبل اختبار فحص الدم؛ إلا أنه يُوصى بأن يتجنب مرضى الناعور التمارين المجهدة قبل سحب الدم.

### الفحوصات المخبرية

- سيتبع المختبر في مركز علاج الهيموفيليا المحلي إرشادات صارمة للغاية حول كيفية فحص الدم لتشخيص مرض الهيموفيليا وكيفية مراقبة مستوى عامل التخثر في الدم بمرور الوقت.
- يتم إجراء فحص الدم من قبل كادر يتمتع بالمعرفة والخبرة في فحوصات التخثر المخبرية مع استخدام المعدات والكواشف الصحيحة التي تمّت المصادقة عليها لهذا الهدف المحدد.